

25-NBOMe / NBOMe⁷³

Grupp: hallucinogener.

Sammansättning och former: pulver och som tillsatt aktiv ingrediens på frimärken/läskpapper (trippar), kristallin kemikalie, pulver löst i organiskt lösningsmedel.

Benämningar:

- 25B-NBOMe: 2C-B-NBOMe, NBOMe-2C-B, Cimbi-36
- 25C-NBOMe: 2C-C-NBOMe, NBOMe-2C-C, Cimbi-82, Pandora, Dime
- 25D-NBOMe: 2C-D-NBOMe, Cimbi 138
- 25H-NBOMe: 2C-H-NBOMe
- 25I-NBOMe: NBOMe-2C-I, 2C-I-NBOMe, BOM-CI, Cimbi-5, Solaris, Legal acid, 25-I.

Missbruksdoser:

- 25B-NBOMe: Prekliniska studier med 25B-NBOMe har föreslagit att den orala dosen i mängden 300-600 µg bör kunna ge signifikanta hallucinationer. Användare har rapporterat starka psykedeliska effekter vid doser kring 500 µg.
- 25C-NBOMe: Användare har rapporterat 25C-NBOMe som aktiv hallucinogen drog vid låga doser (200-1000 µg) vid oral och nasal administration.
- 25D-NBOMe: Användare har rapporterat 25D-NBOMe som aktiv hallucinogen och framkallande av eufori vid doser på 500-1000 µg.
- 25H-NBOMe: Via internet-forum har doser kring 500 µg rapporterats för oral konsumtion av NBOMe.
- 25I-NBOMe: Via internet-forum har doser kring 500 µg rapporterats för oral konsumtion av NBOMe

Tillförselsätt:

- 25B-NBOMe: Oral och nasal administration
- 25C-NBOMe: Oral och nasal administration.
- 25D-NBOMe: Oral administration
- 25H-NBOMe: Oral administration
- 25I-NBOMe: Oral och nasal administration

Verkningsmekanism/effekt: Hallucinogena; se även under Hälsorisker nedan. Via internetforum beskrivs 25B-NBOMe av användare som en kraftfull hallucinogen drog med långvarig tripp-tid.

Hälsorisker:

Användare av 25-NBOMe (NBOMe) har rapporterat effekter såsom paranoia, rädsla, oroliga reaktioner, ökad hjärtverksamhet, sömnlöshet och illamående. Dock är idag mycket lite känt om lång-tidseffekterna, säkerhetsaspekter, beroende-potentialen för dessa preparat.

⁷³ Uppgifterna är hämtade från från FHI:s klassificeringsdokument (DNR 2013/302, 2013/303 2013/304, 2013/305 och 2013/399).

Giftinformationscentralen har rapporterat om 2 sjukhusfall angående 25C-NBOMe där symtom har varit förändrad tidsuppfattning, förvirring, oro, vida pupiller samt hög puls.

Giftinformationscentralen har rapporterat om 8 fall (varav 7 fall från sjukhus) angående 25I-NBOMe där symtom som förekommit har varit stora pupiller, svårt att prata, stelhet, hallucinationer, aggressivitet, oro, hög puls och högt blodtryck.

Från Storbritannien har rapporterats om att sju användare av 25I-NBOMe förts till sjukhus efter intoxication av drogen. Rapporterade biverkningar inkluderar höjt blodtryck, ökad hjärtverksamhet, visuella och hörselmässiga hallucinationer, självskada, häftig oro och aggressivitet, kramper, hög feber, metabolisk acidosis och förhöjt antal vita blodkroppar. Två av användarna krävde intensivvård. Ett av fallen hade svår rabdomyos (muskelsönderfall) som resulterade i njursvikt, samtliga fall hade förhöjd kreatinkinasa (ett enzym) av olika grad.

Det har rapporterats om att 2C-I-N-BOMe/25INBOMe har kopplats till dödsfall i Kalifornien, Louisiana, Minnesota, North Dakota och Virginia. Substansen betraktas som en mycket potent hallucinogen. Substansen påstås vara mycket mer potent och dödlig än liknande tidigare förekommande substanser.

Fall ifrån USA som inkluderat symtom som svåra hallucinationer och långvarig häftig oro, höjt blodtryck, ökad hjärtverksamhet, aggressivitet, förstörda pupiller har rapporterats genom 25I-NBOMe (25-I) intoxication med laborativ verifikation av substansen i serum.

Medier i Australien har rapporterat om överdoser och dödsfall vid användning av drogerna 25I-NBOMe samt 25B-NBOMe.

Sammanfattande beskrivning: Strukturlika hallucinogener som är verksamma vid mycket små doser.