

Bromazepam¹⁰

Grupp: bensodiazepiner.

Sammansättning och former: vitt eller gult pulver, förekommer huvudsakligen som läkemedel i tablettform (1,5 – 6 mg), ej registrerat som läkemedel i Sverige.

Benämningar: bromazepam, bromazepamum, Anxyrex, Brazepam, Bromalex, Bromam, Bromazep, Bromidem, Compendium, Creosedin, Durazanyl, Gityl, Lectopam, Lexaurin, Lexilium, Lexomil, Lexotam, Lexotan, Lexotanyl, Normoc, Quietiline, Ultramidol, "ryska roppar", "tjeckiska roppar".

Doser: ej dokumenterade. Dagsdoser vid medicinsk användning mot oro är 3 – 18 mg.

Tillförselsätt: nedsväljning, injicering, troligen även rökning.

Ruseffekter: avhämning, eufori, minskad oro. Vid höga doser minskad vakenhet och förvirring.

Biverkningar: svårberäknliga ruseffekter, dåsighet, nedsatt vakenhet, minnesluckor, förvirring, sluddrigt tal, nedsatt stämningsläge, kraftlöshet, ataxi, koordinationssvårigheter, yrsel, störningar i andningsfunktionen, medvetlöshet. Livshotande förgiftningar kan uppträda.

Beroenderisk: troligen som flunitrazepam: abstinensreaktioner vid hastig utsättning redan efter någon månads konsumtion av medicinska doser. Abstinensreaktionerna kan bli allvarliga med förvirring, personlighetsstörningar (depersonalisering), hallucinationer och epileptiska anfall.

Skadeverkningar-risker: domningskänsla och stickningar i extremiteter, livshotande förgiftningar, minnesluckor, hallucinationer, vissa indikationer finns på att medlet kan användas som strategisk drog för att underlätta brott.

Sammanfattande beskrivning: Bromazepam har under senare år fått viss uppmärksamhet som ett möjligt ersättningsmedel för flunitrazepam i dess hittills unika användning som strategisk drog vid genomförande av planerade brott. Rus- och skadebilden har stora likheter med den hos flunitrazepam.

¹⁰ Se även Bensodiazepiner i allmänhet och avsnitt 4.3.