

Bufedron

Grupp: syntetiska katinoner.

Sammansättning och former: vitt pulver, som bl.a. utbjuds på internet ofta med en hög renhetsgrad.

Benämningar: bufedron, buphedrone, 2-metylamin-1-fenylbutan-1-on.

Doser: En missbruksdos får anses vara ca 75 mg ren substans.

Tillförselsätt: kan sväljas i lösning eller inlindat i toalettpapper, kan snusas (snortas), kan tillföras rektalt (uppföras i ändtarmen), torde kunna injiceras och rökas men sådant missbruk är inte dokumenterat.

Ruseffekter: eufori.

Biverkningar: huvudvärk, illamående, yrsel, oro, ångest, förvirring.

Beroenderisk: ej fullständigt kartlagd, med hänsyn till likheterna med mefedron torde bufedron ha en betydande beroendepotential.

Skadeverkningar-risker: huvudvärk, illamående, yrsel, oro, ångest, förvirring.

Sammanfattande beskrivning: Högsta domstolen har i ett flertal mål bedömt farligheten hos de syntetiska katinonerna, se t.ex. NJA 2011 s. 357 och NJA 2011 s. 675 I och II.

Av dessa domar kan man dra följande slutsatser gällande syntetiska katinoner.

- Alla syntetiska katinoner bör i farlighetshänseende jämföras.
- Den generella farligheten hos syntetiska katinoner skiljer sig inte från amfetamins generella farlighet på något avgörande sätt.
- Det finns inte heller i mängdhänseende stöd för att bedöma de syntetiska katinonerna annorlunda än amfetamin.