

Buprenorfin

Grupp: opioider.

Sammansättning och former: vitt eller svagt färgat pulver, vanligtvis som hydrokloridsalt, i medicinskt bruk som tabletter eller resoribletter (ett slags tabletter som läggs under tungan för att den verksamma substansen skall lösas ut långsamt).

Benämningar: buprenorfin, buprenorphinum, Anorfin, Buprenex, Buprex, Buprine, Lepetan, Nopan, Prefin, Subutex, Temgesic.

Doser: En missbruksdos motsvarar 2 mg (4 doser från en tablett om 8 mg).

Tillförselsätt: nedsväljning av tabletter, injektion av upplösta tabletter, i sällsynta fall snusning av pulveriserade tabletter.

Ruseffekter: eufori (dock utan tydlig "kick" eller "rush" som vid heroinpåverkan), smärtlindring.

Biverkningar: huvudvärk, asteni (kraftlöshet), dåsighet, sömnlöshet, svimning, yrsel, förstoppning, illamående, kräkning samt svettning. Mer sällsynta biverkningar är leverskada (nekros) samt andningsdepression och hallucinationer.

Beroenderisk: som metadon.

Skadeverkningar-risker: livshotande förgiftningar.

Sammanfattande beskrivning: Buprenorfin liknar i flera avseenden metadon, och har även likheten med metadon att användas som ersättningsmedel för heroin i medicinsk underhållsbehandling av opiatmissbrukare. Beroenderisken är samma som för metadon. Buprenorfin påverkar också centrala nervsystemets opiatreceptorer (om än med en mycket sammansatt verkan). Buprenorfin kan framkalla livshotande förgiftningar.

Kombinationspreparatet Subuxone innehåller buprenorfin och naloxon, som tillsatts för att hindra eller försvåra injektion av upplösta tabletter.