

Difenoxylat

Grupp: opioider.

Sammansättning och former: vitt eller svagt färgat pulver, som läkemedel i tabletter, även som lösning för nedsväljning.

Benämningar: Tabletter med varunamn som Dhamotil, Diarsed, Diastop, Difenoxylato, Diphenatol, Diphenoxylate, Diphenoxylate And Atropine, Eldox, Erlotyl, Intard, Lofene, Logen, Lomocot, Lomotil, Lonox, Reasec, Remodil, Retardin, Tropergen, Vi-Atro l m.fl.

Doser: från 50 mg vid nedsväljning.

Tillförselsätt: nedsväljning, medlet kan knappast injiceras p.g.a. låg löslighet i vatten, snusning torde vara verkningslös av samma anledning, rökning tillsammans med t.ex. tobak eller annat växtmaterial kan tänkas men har ej dokumenterats.

Ruseffekter: eufori, dåsighet, kraftlöshet m.m.

Biverkningar: dåsighet, yrsel, huvudvärk, nervositet, rastlöshet, illamående och uppkastningar, depression, kraftlöshet, hjärtklappningar, domningar i extremiteter, aptitförlust samt allergiska reaktioner och buksmärter, nedsatt reaktionsförmåga vid bilkörning m.m., vid intag av stora doser livshotande förgiftning.

Beroenderisk: vid korrekt medicinskt bruk låg beroenderisk, vid missbruk av stora doser även toleransutveckling och abstinensreaktioner av opiattyp.

Skadeverkningsrisker: mag- och tarmbesvär (förstoppning), allergiska reaktioner, livshotande förgiftning.

Sammanfattande beskrivning: Difenoxylat kan framkalla eufori vid missbruk av stora doser. Det saknar dock morfinets och heroinets smärtstillande effekter. Difenoxylat kan ej injiceras och därför i praktiken inte missbrukas för att åstadkomma hastigt insättande euforiska rus ("kickar") av samma slag som vid t.ex. heroininjektioner. Difenoxylat kan vid tillförsel av stora doser framkalla livshotande förgiftningar genom att det orsakar andningsdepression och djup medvetslöshet. Vid regelbundet intag av stora doser ger det upphov till toleransutveckling och abstinensreaktioner. Som missbruksmedel används det även för att dämpa opiatabstinens.