

DOB

Grupp: hallucinogener.

Sammansättning och former: DOB, 2,5-dimetoxi-4-bromamfetamin, vita kristaller, kan förekomma utblandat i tabletter (även små sådana, s.k. "microdots") och har förekommit även intorkat på läskpappersbitar.

Benämningar: brolamfetamin, DOB, "Brom-STP".

Doser: 1,0 – 3,0 mg. Enligt vissa studier sinnespåverkan redan vid 0,4 mg. I tysk rättstoxikologisk praxis 2,5 mg vid intag genom nedsväljning. Drogen anses vara en av de mest potenta av alla kända droger av ecstasy-typ.

Tillförselsätt: nedsväljning av tabletter eller pappersbitar.

Ruseffekter: eufori, talförhet, abnorm fokusering på detaljer, hallucinationer, ruset kan vara 18 – 30 timmar. I enstaka fall har rus upp till 72 timmar rapporterats.

Biverkningar: sömnsvårigheter, ångest, förvirring, depersonalisationsfenomen, aggressivitet med våldsurladdning, hjärtrubbningar, uttorkning, kramper, livshotande förgiftningar.

Beroenderisk: som amfetamin.

Skadeverkningar-risker: livshotande förgiftningar, dödlig dos har i vissa källor uppskattats till mellan 30 och 35 mg, enligt andra till 100 mg.

Sammanfattande beskrivning: DOB har samma huvudsakliga effekter som MDMA men är påtagligt starkare. DOB kan ge mycket långdragna rus och framkalla livshotande förgiftningar. Dödsfall har förekommit. Missbruket är ovanligt och därför är den fulla riskbilden ej fullständigt utredd. DOB bör dock anses ha potential som ersättningsmedel för MDMA.