

DOC

Grupp: hallucinogener.

Sammansättning och former: DOC, 4-klor-2,5-dimetoxi-amfetamin. Förekommer som pulver, vätska, blotters, tabletter och kapslar.

Benämningar: DOC.

Doser: 1,5 – 3,0 mg. Viss sinnespåverkan redan vid 0,6 mg. Drogen anses vara en av de mest potenta av alla kända droger av ecstasy-typ.

Tillförselsätt: nedsväljning av tabletter etc. eller i dryck, snusning (snortning) av pulver, injektionsmissbruk bland amfetaminmissbrukare har rapporterats, kan rökas.

Ruseffekter: eufori, hallucinationer. Ruset kan vara 12 – 24 timmar.

Biverkningar: troligen likartade DOB.

Beroenderisk: troligen som amfetamin eller DOB.

Skadeverkningar-risker: troligen psykosor, giftighet ej utredd.

Kommentar: Dokumentationen om skadeverkningar m.m. är begränsad. FHI analogiserar till DOB, amfetamin, MDMA, LSD m.fl. i sin diskussion av risker m.m.

Sammanfattande beskrivning: DOC är en mycket potent variant av MDMA-gruppen. Rusbilden överensstämmer till stor del med den hos MDMA. P.g.a. det hittills ringa missbruket är riskerna ofullständigt kartlagda. DOC bör dock anses ha potential som ersättningsmedel för MDMA.