

Fencyklidin (PCP)

Grupp: hallucinogener.

Sammansättning och former: vitt pulver, ofta i kapslar, används ibland för att förfälska andra narkotika (THC, LSD), kan sprutas på svamp eller persilja för att efterlikna psilocybinhaltig svamp resp. marijuana.

Benämningar: fencyklidin, PCP, Sernyl eller Sernylan (som läkemedel på 1960-talet), "angel dust", "Cadillac", "Crystal", "elefanttjack", "peace pill", "ängladamm".

Doser: 5 – 10 mg.

Ruseffekter: eufori, hallucinationer, desorientering, bedövning (anestesi), förändrad kroppsupplevelse, katalepsi.

Biverkningar: muskelstelhet, kramper, aggressivitet, andningsförämning, livshotande förgiftning.

Beroenderisk: medlet självadministreras av djur vid experiment.

Skadeverkningar-risker: psykoser, depressioner, personlighetsförändringar, livshotande förgiftningar.

Sammanfattande beskrivning: Fencyklidin företer ett brett och allvarligt spektrum av rus- och skadeverkningar, allt från psykoser till livshotande förgiftningar. Detta överensstämmer till stor del med riskerna vid missbruk av MDMA. Fencyklidin uppvisar dock större risker för aggressionsutbrott och liknar i detta avseende flunitrazepam. Fencyklidin-missbrukare kan vara synnerligen svåra att omhänderta vid polisingripanden. Däremot synes beroenderisken inte vara lika stor för PCP som för t.ex. heroin.