

Fenetyllin

Grupp: syntetiska centralstimulantia av amfetamintyp.

Sammansättning och former: kristaller, vanligen som hydroklorid, som läkemedel i form av tabletter.

Benämningar: fenetyllin, Captagon, Fitton m.fl.

Doser: 50 mg fenetyllin i Captagon-tabletter används mot narkolepsi. En eller flera tabletter framkallar rus.

Tillförselsätt: nedsväljning av tabletter är vanligast.

Ruseffekter: som amfetamin med bl.a. ökad puls, ökat blodtryck, förhöjd kroppstemperatur, känsla av extra energi, minskat sömnbehov, eufori.

Biverkningar: oro, sömnsvårigheter.

Beroenderisk: som amfetamin.

Skadeverkningar-risker: depression, kraftlöshet, sömnsvårigheter, hjärt- och kärlsjukdomar, undernäring med avmagring, psykoser.

Sammanfattande beskrivning: En jämförelse med amfetamin är naturlig, eftersom fenetyllin har likartade centralstimulerande effekter. Missbruk av fenetyllin har dock främst skett genom nedsväljning. Injektionsmissbruk har inte rapporterats, varför effekterna av stora doser och kraftfulla rus ej är kända. Det finns dock skäl att anta att de kan vara likartade amfetaminets. Fenetyllin är sannolikt ej något primärt missbruksmedel bland etablerade intravenösa amfetaminmissbrukare. Fenetyllin kan dock ha betydande potential för spridning i andra kretsar som kraftfullt vakenhets- och aktivitetsförhöjande medel, inte minst bland människor som vill förskjuta sin dygnsrytm och sina sömnperioder. Medlet har blivit populärt som "feriepiller" bl.a. i Sydostasien. Missbruk har rapporterats även från Mellanöstern.