

## **Fenmetrazin**

*Grupp:* syntetiska centralstimulantia av amfetamintyp.

*Sammansättning och former:* vitt eller svagt färgat pulver.

*Benämningar:* fenmetrazin, fenmetralin, phenmetrazine, phenmetrazinum, Preludin.

*Doser:* som amfetamin: p.g.a. toleransutveckling kan dagsintaget bli mycket högt.

*Tillförselsätt:* nedsväljning av tabletter eller lösning, intravenös injektion, snusning eller rökning (båda torde vara sällsynta).

*Ruseffekter:* eufori, känsla av energi och verksamhetslust, oövervinnelighet.

*Biverkningar:* muntorrhet, motorisk oro, hjärklappning, ångest, desorientering, vid stora doser: paranoida psykoser med aggressivitet och farlighet för omgivningen, impulsgenombrott.

*Beroenderisk:* som amfetamin, toleransutvecklingen kan bli ytterst stark, svåra abstinensreaktioner med utmattning, ångest, retlighet, koncentrations-svårigheter, aggression, långvarig sömn.

*Skadeverkningar-risker:* uttorkning, svåra tandskador, kraftig avmagring, störningar i motoriken, paranoida psykoser med hallucinationer, vid långvarigt missbruk även förhöjd dödlighet p.g.a. hjärtsvikt, olyckshändelser m.m.

*Sammanfattande beskrivning:* Fenmetrazin har i allt väsentligt samma ruseffekter och risker som amfetamin och har visat sig kunna ersätta detta. Fenmetrazinet var mycket vanligt i Sverige på 1950- och 1960-talen. En egenhet med fenmetrazin i förhållande till amfetamin att missbrukare kan injicera oerhört stora doser fenmetrazin och att toleransutvecklingen kan bli mycket hög.