

Katin

Grupp: kat m.fl.

Sammansättning och former: vitt pulver som förekommer naturligt i kat (*Catha edulis*), som läkemedelsberedning i tabletter eller lösning.

Benämningar: katin, norpseudofedrin, Adistop, Mirapront N, X-112.

Doser: vid injektion av 80 mg tydliga effekter, stark påverkan med aggressivitet, katin har ansetts ha en sjättedel av effekten hos amfetamin.

Tillförselsätt: nedsväljning, injektion av pulver, krossade och upplösta tabletter eller färdig lösning.

Ruseffekter: eufori, kraftig stimulans, rastlöshet, talträngdhet, katin har även använts vid idrottsträning för att kunna träna längre.

Biverkningar: hjärtklappning, nervsammanbrott, ångestladdade toxiska psykoser.

Beroenderisk: som amfetamin, beroendeutveckling har i Tyskland rapporterats uppträda efter några veckors missbruk, katin används även som ersättningsmedel av heroinister.

Skadeverkningsrisker: apati, paranoida psykoser med hallucinationer, lever-skador, hjärtbesvär, impotens, likgiltighet.

Sammanfattande beskrivning: Katin har i stort sett samma effekter som amfetamin men kräver högre doser för att nå dessa. Skadebilden är den samma. Katin är dock knappast ersättningsmedel för amfetamin hos etablerade amfetaminmissbrukare. Katin har däremot potential för missbruk som allmänt vakenhets- och aktivitetshöjande medel, inte minst bland människor som vill förskjuta sin dygnsrytm och sina sömnperioder.