

## **MDMA och andra ecstasyvarianter**

*Grupp:* hallucinogener.

*Sammansättning och former:* vita pulver, på den illegala marknaden som kapslar eller som tabletter med präglning av specifika märken (logotyper).

*Benämningar:* MDA, MDMA, MMDA, "Adam", "XTC" m.fl.

*Doser:* MDMA: 80 – 150 mg, MDA: 80 – 160 mg, MMDA: 100 – 250 mg. Högsta domstolen har i NJA 2012 s 115 utgått från att 100 mg ecstasy motsvarar en dos och i NJA 2012 s 510, antagit att en ecstasy tablett får anses motsvarar en missbruksdos.

*Tillförsätsätt:* nedsväljning av tablett eller dryck med upplöst pulver, snusning kan förekomma, injektioner torde vara sällsynta.

*Ruseffekter:* hela gruppen har samma huvudsakliga effekter som MDMA med eufori och hallucinationer, stegrad empati, sexuellt intresse, för MDEA synes den empatiska effekten ("välviljan mot andra människor") dock inte vara lika stark som för MDMA.

*Biverkningar:* bristande muskelkoordination, illamående, svårigheter att fokusera synen, temperaturstegring, koncentrationssvårigheter, ångest med aggressivt beteende, uttorkning, kramper, hjärt- och kärlrubbingar, vid stor överdos: livshotande förgiftningar.

*Beroenderisk:* för hela gruppen troligen som MDMA, toleransstegringen kan bli så stark att missbrukaren knappast upplever någon effekt alls efter flerfaldigt upprepat intag i snabb följd.

*Skadeverkningar-risker:* avmagring, förgiftningsskador på nervsystemet (neurotoxicitet), livshotande förgiftningar, psykosor, personlighetsförändringar. Högsta domstolen har i farlighetshänseende jämfört ecstasy med amfetamin.