

Mefedron

Grupp: syntetiska katinoner.

Sammansättning och former: vitt eller svagt guldfärgat pulver, förekommer även i kapslar eller tabletter.

Benämningar: mefedron, mephedrone, 4-metylmekatinon, 4-MMC, mmcat, 4-MC, MD-3, "meph", "Roxy", "subcocal", "krabba", "kräfta", "räka", "räk-mjöl" (p.g.a. doften), "plant food".

Doser: En missbruksdos får anses vara ca 75 mg ren substans.

Tillförsätsätt: nedsväljning (ofta inlindat i toalettpapper), snortande ger snabbare insättande effekter men kan upplevas som obehagligt p.g.a. slemhinneretande effekter, kan rökas, injektion och rektal tillförsel har rapporterats.

Ruseffekter: eufori, förhöjd sinnesstämning, energikänsla med aktivitetsbehov, stegrad empati med markerad välvilja mot andra människor, betydande likheter i rusbilden med både amfetamin-kokain resp. MDMA, kraftigt vidgade pupiller, upplevelse av intensifierade färger, synrubbingar, vid högre doser: sexuell upphetsning och orgasmliknande kroppsupplevelse, hallucinationer, ruset kan vara 3 – 4 timmar efter en enstaka dos men förlängs ofta genom upprepad tillförsel så att den totala rusperioden kan uppgå till 24 timmar.

Biverkningar: slemhinneretande (kan göra snortande obehagligt), diarréer, illamående, svettningar, brännande eller stickande känsla i huden, spänningar i käkarna, mörkt röd-blå fläckar och sårbildning på huden, uttorkning (kan bli kraftig), temperaturstegring och feber, blodtrycksstegring, huvudvärk, sluddrigt tal, slöhet, erektionsproblem och anorgasmi, yrsel, ångest, hallucinationer och psykos, flashbacks och självmordstankar under abstinens, medvetlöshet, enstaka dödsfall har rapporterats i samband med mefedronintag. I Sverige rapporterades ett dödsfall orsakat av mefedron 2009.

Beroenderisk: mycket hög, flerfaldiga berättelser om personer som snabbt kommit in i en hastigt upprepad tillförsel med flera intag ("refill") per dygn, sammanlagt intag under en utvidgad rusperiod på mer än ett dygn kan överstiga 1 gram (1000 mg).

Skadeverkningar-risker: kramper, hjärtpåverkan, blodtrycksstegring, pulsstegring, temperaturstegring, uttorkning, medvetlöshet, enstaka dödsfall misstänks ha samband med intag, ett dödsfall orsakat av mefedron rapporterades i Sverige 2009, hallucinationer, psykos (förvirring), depression och självmordstankar under abstinens.

Sammanfattande beskrivning: Högsta domstolen har i ett flertal mål bedömt farligheten hos de syntetiska katinonerna, se t.ex. NJA 2011 s. 357 och NJA 2011 s. 675 I och II.

Av dessa domar kan man dra följande slutsatser gällande syntetiska katinoner.

- Alla syntetiska katinoner bör i farlighetshänseende jämföras.

- Den generella farligheten hos syntetiska katinoner skiljer sig inte från amfetamins generella farlighet på något avgörande sätt.
- Det finns inte heller i mängdhänsesedd stöd för att bedöma de syntetiska katinonerna annorlunda än amfetamin.