

MPPP

Grupp: opioider.

Sammansättning och former: vitt pulver, som gatuberedning ofta med inblandning av MPTP p.g.a. ofullständigt kontrollerad syntes.

Benämningar: MPPP, metylfenylpropionoxipiperidin, "new heroin", "syntetiskt heroin".

Doser: 5 – 10 mg.

Tillförsätsätt: injektion, nedsväljning, rökning.

Ruseffekter: eufori, smärtlindring.

Biverkningar: starkt brännande känsla i venerna (vid intravenös injektion), metallsmak i munnen, ryckningar och bedövningskänsla i armar och ben, smärta, spänning, eller stelhet i muskler eller "frysning" av muskler, balans- och koordinationsproblem, förlust av ansiktsmimik, svårigheter att öppna ögonen, synrubbningar, skakningar eller darrningar, svårigheter att tala och svälja, dreglande, kraftig svettning, hallucinationer.

Beroenderisk: troligen som heroin.

Skadeverkningar-risker: eftersom MPPP för den illegala marknaden framställs i enkla laboratorier med dålig eller obefintlig kvalitetskontroll kan som biprodukt bildas MPTP, som är höggradigt neurotoxiskt och hos missbrukare kan framkalla parkinsonliknande skador med svår stelhet ("frozen addicts"). MPTP har visat sig förstöra dopaminneuron i hjärnan.

Sammanfattande beskrivning: MPPP är en syntetisk opiat och har samma huvudsakliga ruseffekter som heroin. Det bör anses vara särskilt farligt genom att medlet i den form som vanligtvis förekommer på den illegala marknaden p.g.a. inblandning med MPTP kan framkalla svåra neurotoxiska skador.