

N-bensylpiperazin (BZP)

Grupp: syntetiska centralstimulantia av amfetamintyp.

Sammansättning och former: N-bensylpiperazin, som bas svagt gulgrönt pulver, som hydroklorid vitt pulver, basformen är frätande och kan orsaka brännskador, säljs även som tabletter med påtryck, i en del fall som MDMA-förfälskningar (sådana kan innehålla även TFMPP).

Benämningar: 1-bensylpiperazin, N-bensylpiperazin, bensylpiperazin, BZP, "A2", "frenzy", herbal high", "jax", "legal XTC", "nemesis", "pepper extract", "prep twisted".

Missbruksdoser: oralt: 50 – 200 mg, vissa uppgifter från 20 mg, en missbruksdos torde kunna bestämmas till 50 mg.

Tillförselsätt: oralt, enstaka rapporter om injektion, i hydrokloridform torde medlet kunna snusas (snortas), rökas och intas rektalt men sådan tillförsel synes vara sällsynt.

Ruseffekter: eufori, ökad vakenhet, ökad vaksamhet på omgivningen, ökat socialt intresse, hallucinationer, ruset kan vara 6 – 8 timmar, vid mycket stora doser (ca 500 mg) effekter upp till 48 timmar.

Biverkningar: klåda, illamående, törst, bröstsmärtor, hjärtklappning, uppkastningar, hyperventilering, svårkontrollerad rörelselusta, migränliknande huvudvärk, svåra epileptiska anfall, urinretention, synestesier, oro för kroppsförvanskning (dysmorfi), sömnsvårigheter, psykos.

Beroenderisk: BZP kan ersätta amfetamin vid injektionsförsök hos tillvanda amfetaminister, toleransutveckling kan förekomma.

Skadeverkningar-risker: epileptiska anfall med kramper, uttorkning med överkompenserande vätskeintag, njursvikt, tankestörningar, psykos, livshotande förgiftningar, enstaka dödsfall efter samtidigt intag av MDMA.

Sammanfattande beskrivning: BZP har stora likheter med amfetamin. Vid injektionsförsök hos tillvanda amfetaminister har BZP visat sig kunna ersätta amfetamin samt vid djurförsök även kokain. BZP anses vid dosjämförelser (vikt för vikt) vara en tiondel så potent som amfetamin. En dos om 50 mg BZP skulle då motsvara 5 mg amfetamin.