

Oxikodon

Grupp: opioider.

Sammansättning och former: Oxikodonhydroklorid, vitt eller svagt färgat pulver som bereds som injektionslösning eller tabletter för medicinskt bruk.

Benämningar: oxikodon, oxykodon, oxycodone, Dinarkon, Endocodone, Endone, Eubine, Eucodal, Eukodal, Oxanest, OxiContin, OxyContin, Oxyfast, Oxygesic, Oxynorm Proladone, Roxicodone m.fl. samt i kombinationspreparat som Endocet, Percocet, Percodan, Roxicet och Tylox m.fl. (dessa innehåller även paracetamol) eller Combunox (detta innehåller även ibuprofen), "OC", "OX", "Oxy", "Oxycotton", "blue", "hillbilly heroin", "kicker".

Doser: uppskattningsvis 5 mg vid intravenös tillförel. Snusning (snortande) av tablettkross ger högre effekter än nedsväljning av tabletter. Smärtstillande från 10 mg vid tillförel av depåtabletter.

Tillförel: depåtabletter sväljs, krossade tabletter kan lösas upp och injiceras, i medicinska sammanhang även rektal tillförel (suppositorier som införel i ändtarmen). Nedsväljning av depåtabletter ger lägre effekt än snusning (snortande) eller intravenös injektion.

Ruseffekter: eufori, sedering.

Biverkningar: sedering, omtöckning, minnes- koncentrations- och sömnsvårigheter, i ovanliga fall hallucinationer, förstoppning, illamående, kräkningar, klåda, andningsdepression, allvarliga förgiftningar.

Beroenderisk: som morfin eller heroin, märkbar toleransutveckling.

Skadeverkningar-risker: livshotande förgiftningar, andningsförlamning, mag- och tarmbesvär.

Sammanfattande beskrivning: Oxikodon är en syntetisk opiat som används som smärtstillande medel främst i depåtabletter för att åstadkomma långsam verkan. Det kan användas som ersättningsmedel (korsvis användning) för heroin, och det förekommer att heroinmissbrukare löser upp tabletter och injicerar lösningen i rusyfte. Dödsfall har förekommit. Mekanismen är här den samma som för heroin, nämligen andningsförlamning. Toleransutveckling kan vara betydande. Beroenderisken vid medicinskt bruk finns dokumenterad, men den anses inte utgöra något problem vid korrekt behandling av svåra smärtor.