

pFBT/Fluortropakokain

Grupp: koka och kokain m.m.

Sammansättning och former: vitt pulver, som framställs syntetiskt. Vid försäljning på internet uppges halten kunna vara 99 procent.

Benämningar: pFBT, fluortropakokain, 4-fluortropakokain, (8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-fluorbensoat, 3-(p-Fluorbensoyloxi)tropan, 3-p-fluorbensoyl-tropan, 3-pseudotropanyl-4-fluorbensoat.

Missbruksdoser: ej kända.

Tillförsätsätt: kan sväljas, snusas (snortas) och tillföras rektalt (genom ändtarmen), kan troligen injiceras och rökas men sådant missbruk har ej dokumenterats.

Ruseffekter: som kokain med bl.a. eufori, lokalbedövande egenskaper vid snortande.

Biverkningar: ökad puls, stegrat blodtryck, oregelbunden hjärtverksamhet, vid höga doser allvarlig hjärtpåverkan och hjärtinfarkt, kramper, ångest, psykos.

Beroenderisk: sannolikt som kokain, men den korta observationstiden har inte medgivit redovisning av en mer detaljerad bild, pFBT används av missbrukare som substitut för kokain.

Skadeverkningar-risker: risk för allvarlig hjärtpåverkan med hjärtinfarkt, ångest, psykos med hallucinationer.

Sammanfattande beskrivning: Fluortropakokain är en ny substans på drogmarknaden. Den har samma huvudsakliga effekter som kokain och används i missbrukssammanhang som substitut för kokain.